

# Avertissements agricoles

DLP-9-6-880299,9

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège  
(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et les GVA)

N° 9 du 8 Juin 1988

\*\*\*\*\*  
\* SPECIAL TOURNESOL \*  
\*\*\*\*\*

SOMMAIRE : PHOMOPSIS DU TOURNESOL

SESAMIE DU MAIS

\*\*\*\*\*  
\* TOURNESOL \*  
\*\*\*\*\*

NOUS OBSERVONS DU PHOMOPSIS SUR TIGES ET  
DES SYMPTOMES SUR FEUILLES DANS LES SECTEURS SUIVANTS :  
BRAM - VILLEPINTE - PEXIORA - SOUILHE

Le pourcentage de plantes visuellement touchées par la maladie est faible, cependant les incubations sont longues et il est possible que de nouvelles plantes extériorisent les atteintes du champignon. Les conditions actuelles sont favorables au développement du parasite et la lutte est strictement préventive

IL EST IMPERATIF DE PROTEGER VOS CULTURES

Nous disposons de 5 pièges à ascospores implantés à CARCASSONNE

BRAM

CASTELNAUDARY

SOUILHE

PECHARIC ET LE PY


MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



Les informations que nous en recueillons indiquent l'activité du *Phomopsis*, principalement après chaque période pluvieuse où les émissions d'ascospores sont localement très abondantes. Les conseils de traitements qui ont été diffusés jusqu'à présent précédaient les maximums d'émissions d'ascospores.



1° CULTURES TARDIVES allant du stade 2 feuilles à 4 ou 6 feuilles en toutes zones et toutes variétés (y compris T.N.15)

TRAITEZ A L'AIDE DE PELTAR FLO A 5 L/HA

2° CULTURES PRECOCES taille du tournesol comprise entre 50 et 60 cm à la limite des possibilités de passage avec tracteur et rampe. en toutes zones et toutes variétés (y compris T.N.15)

TRAITEZ A L'AIDE DE PELTAR FLO A 7 L/HA

3° CULTURES DEJA TRAITEES si le traitement remonte à 15 jours environ renouvelez l'application en tenant compte des indications de stade indiquées aux paragraphes précédents

-cultures dont la taille est inférieure à 50 cm PELTAR FLO 5 L/HA

-autres cas ..... PELTAR FLO 7 L/HA

Le renouvellement de la protection après 15 jours tient compte de l'usure des produits d'une part, et de la partie de la plante ayant poussé après le traitement d'autre part

( les matières actives utilisées ne sont pas systémiques )

\*\*\*\*\*  
\* M A I S \*  
\*\*\*\*\*

POURSUITE DU VOL DE SESAMIE

TRAITEZ IMPERATIVEMENT VOS CULTURES NON ENCORE PROTEGEES A L'AIDE DE DIMILIN A 0.5 KG/HA

Pour les cultures déjà traitées renouvelez fin de semaine ou semaine prochaine, surtout si les pluies ont été abondantes.

Tirage du 8 Juin 1988 - 1700 exemplaires

Bulletin technique des Avertissements Agricoles - Montpellier 1988